

بررسی مقایسه‌ای اثر پراکسید هیدروژن (آب اکسیژن) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخمر قزل‌آلای رنگین کمان *(Oncorhynchus mykiss)*^{۲۹}

سید علی جعفرپور*

فیاد آذری تاکامی*

علیرضا میرواقفی^۳

چکیده

در این تحقیق، پراکسید هیدروژن به عنوان ماده شیمیایی جدید در کنترل آلودگی‌های قارچی تخمرهای قزل‌آلای رنگین کمان مورد آزمایش قرار گرفت و با نتایج حاصل از سبز مالاشیت که به طور معمول برای ضد عفونی کردن تخمرهای ماهی به کار می‌رود، مقایسه شد، در آزمایش‌های *In vitro*، تیمارهای ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ قسمت در میلیون (ppm) از پراکسید هیدروژن به طور موثری رشد قارچ را بر روی محیط کشت کنترل کردند. در آزمایش‌های *In vivo* نیز، تیمار با غلظت ۲۵۰ ppm از پراکسید هیدروژن به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۰°C برای کنترل رشد قارچ، مناسب تشخیص داده شد و با تیمار سبز مالاشیت به میزان ۲ ppm از لحاظ درصد آلودگی و میزان تلفات تا مرحله چشم‌زدگی تخمرها، تفاوت معنی‌داری نداشت. نتایج به دست آمده نشان داد که پراکسید هیدروژن نه تنها از نظر بهداشتی و آلودگی‌های زیست‌محیطی خطری ندارد، بلکه به سبب آزاد کردن اکسیژن، موجب بهبود کیفیت آب محیط پرورشی می‌شود و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: پراکسید هیدروژن، سبز مالاشیت، آلودگی قارچی، نرخ تلفات و قزل‌آلای رنگین کمان.

۱- تاریخ دریافت: ۸۲/۱۰/۲۸، تاریخ پذیرش: ۸۳/۷/۲۷

۲- این پژوهش با استفاده از اختبارات معاونت پژوهشی به شماره پرونده ۸۱۴/۱۳۰۵ دانشگاه تهران انجام شده است.

۳- استادیار دانشکده متابع طبیعی، دانشگاه تهران (Email:vaghefi@nrf.ut.ac.ir)

۴- استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

۵- دانش آموخته شیلات، دانشکده متابع طبیعی، دانشگاه تهران

مقدمه**پرورش آزادماهیان کلاردشت و شرکت تکثیر و پرورش**

ماهی قزلآلای پاچتار لرستان، انجام شد.

آزمایش‌های تعیین حداقل غلظت پراکسید هیدروژن که مانع رشد قارچ می‌گردد

برای جداسازی و شناسایی گونه قارچی، تعدادی تخم قارچ زده از داخل سینی های انکوباتورها جدا شده، کاملاً با آب مقطر شسته شده، سپس داخل لوله های آزمایش بر روی محیط کشت شاهدانه قرار داده شدند. بعد از یک هفته، زمانی که پرگنه های قارچی ظاهر شد، به کمک آنس از اسپورهای درون لوله آزمایش نمونه برداری شده و بر روی محیط کشت Corn Meal agar منتقل شدند.^(۹)

بعد از مراحل خالص‌سازی قارچ، قطعاتی از محیط کشت حاوی قارچ، به قطر یک سانتی‌متر جدا شده و در داخل پیست های سرداخانه جاسازی شد، سپس هر یک به مدت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در تماس با غلظت‌های پراکسید هیدروژن (۳۵درصد جزء فعال) به میزان ۳، ۳۰ و ۲۵۰ قسمت در میلیون (بی بی ام) قرار داده شدند. سپس نمونه ها به داخل ظرف پتربی حاوی محیط کشت منتقل شد و در گرمخانه با دمای ۲۵°C قرار گرفتند و میزان رشد قارچ بعد از مدت ۴۸ ساعت مورد بررسی قرار گرفت.^(۸) البته با استفاده از روش خالص‌سازی، یکسری از رشته های قارچی جدا شده و با تهیه گسترش مستقیم و رنگ‌آمیزی با بزرگنمایی $\times ۴۰$ مورد شناسایی قرار گرفت.^(۱)

آزمایش‌های تعیین دامنه موثر

آزمایش‌های *In vivo* در دو کارگاه تکثیر انجام گرفت. در آزمایش اول، در کارگاه تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت، برای تخم‌کشی از مولдин ماده ۵ ساله با میانگین ۱۲ عدد تخم در هر گرم، استفاده شد. بعد از عملیات لفاح و فرایند آب‌گیری تخم به مدت یک ساعت، ۱۰۰۰ عدد تخم به صورت تصادفی انتخاب شده و در مرکز سینی جاسازی گردید، و جریان آب به میزان یک لیتر در دقیقه برقرار شد. با توجه به طرح آماری مورد نظر که آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی بود، تیمار غلظت پراکسید هیدروژن به عنوان یک فاکتور در دو سطح ۵۰۰ و ۱۰۰۰ قسمت در میلیون و فاکتور زمان

در ایران، آلودگی‌های قارچی تخم‌های ماهی در کارگاه‌های تکثیر و پرورش، معمولاً از طریق سبز مالاشیت کنترل می‌شود، زیرا این ماده دارای فعالیت‌های ضد قارچی گسترده‌ای است.^(۵) اما استفاده از آن به عنوان عامل ضد قارچ در آبزی‌پروری به دلیل پتانسیل سلطان‌زایی آن بر روی کاربر، از سوی اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا (FDA) در ۲۷ آگوست ۱۹۹۱، ممنوع اعلام شد.^(۸) میزتر و همکاران در سال ۱۹۹۵ عنوان کردند که باقیمانده‌های بسیار ناچیزی از سبز مالاشیت در ماهیان رشد یافته از تخم‌هایی که در معرض این ماده بوده‌اند، تا مرحله بازاری، باقی خواهد ماند.^(۷) از این‌رو صنعت پرورش ماهی در ایران برای جایگزینی سبز مالاشیت، به ماده موثر ضد قارچ که از لحاظ درمانی و تاثیرات جنبی ایمن باشد، نیاز دارد.

در این پژوهش پراکسید هیدروژن یا آب اکسیژن (H_2O_2) به عنوان ماده موثر ضد قارچ در نظر گرفته شد که دارای حداقل تاثیرات سوء بر روی ماهی و محیط زیست است، زیرا در محیط آبی به ملکول آب و اکسیژن تجزیه می‌شود. از طرفی مطالعات اندکی در زمینه استفاده از این ماده شیمیایی به عنوان عامل ضد قارچ بر روی ماهی و تخم ماهی صورت گرفته است.^(۴ و ۷)

مواد و روش‌ها

در این مطالعه از پراکسید هیدروژن برای تعیین حداقل غلظتی که مانع رشد قارچ می‌شود (MIC)^(۱) و آزمایش‌های تعیین دامنه موثر^۲ استفاده شد و سبز مالاشیت نیز به عنوان ماده قارچ‌کش مرجع برای مقایسه اثرگذاری مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا آزمایش‌های *Invitro* با کمک کشت‌های قارچی صورت گرفت.^(۸) سپس آزمایش‌های اثرگذاری بهینه در شرایط کارگاهی بر روی تخم‌های لفاح یافته ماهی قزلآلای رنگین‌کمان در کارگاه‌های تکثیر و

^۱-Minimum Inhibitory Concentration

^۲-Efficacy tests

7°C = درجه حرارت

pH= ۶/۸

D.O. = ۶/۵ mg/Lit

روش های آماری

همان طور که قبل ذکر شد، طرح پژوهشی مزبور در شرایط کارگاهی، در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کاملاً تصادفی به اجرا گذاشته شد و برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شد. در گام، اول برای تعیین این موضوع که آیا تیمارهای شد. در گام، اول برای تعیین این موضوع که آیا تیمارهای غلظت پراکسید هیدروژن و مدت زمان استعمال دارو بر اثر ANOVA متقابل این دو معنی دار باشد یا خیر، به کمک Simple Factorial modle گروهی بر روی صفات شامل درصد عفونت، درصد تخم گشایی و درصد مرگ و میر گرفته شد. در گام بعدی، به منظور مقایسه نتایج حاصله با نتیجه سبز مالاشیت به کمک One way ANOVA و آزمون چند دامنه توکی، مقایسه های لازم به عمل آمد.

شایان ذکر است که تمامی آزمون ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد صورت گرفته و تمامی داده ها در داخل هر گروه از لحاظ فرض همگنی واریانس با آزمون Leven مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج

آزمایش های *In vitro* : همان طور که در جدول (۱) نشان داده شده ، به نظر می رسد که تیمار ۲۵۰ پی ام از H_2O_2 به مدت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به طور موثری از رشد قارچ کشت داده شده، جلوگیری می کند. تیمار با غلظت های کمتر از ۲۵۰ قسمت در میلیون آب اکسیژن، برای کنترل کامل قارچی موثر نیست.

استعمال دارو در دو سطح ۱۵ و ۳۰ دقیقه، اعمال شد (هر تیمار دارای سه تکرار بود). علاوه بر این، گروه کنترل بدون اعمال تیمار نیز در نظر گرفته شد و نتایج با مالاشیت گرین مورد مقایسه قرار گرفت. برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی اندازه گیری شده آب رودخانه مورد استفاده در فرایند انکوباسیون تخم ها به صورت زیر بوده است:

$133 \text{ mg/L as CaCO}_3$ = سختی کل

$124 \text{ mg/L as CaCO}_3$ = خاصیت قلیایی

$10/5^{\circ}\text{C}$ = درجه حرارت

pH = ۷/۸

D.O. $\geq 6 \text{ mg/lit}$

در نهایت، درصد عفونت، تعداد توده های قارچی در هر تکرار، تعداد تخم در هر توده قارچی و درصد تخم گشایی در روز سی و پنجم بعد از تکثیر یعنی بعد از تخم گشایی کامل، برآورد شد.

شایان ذکر است که تیمارها به صورت یک روز در میان تا مرحله تخم گشایی اعمال می شد و به موازات یکسری از پارامترهای آب از قبیل میزان اکسیژن محلول (DO)، درجه حرارت و pH و میزان پتانسیل ردoks^۱ آب و پراکسید هیدروژن نیز مورد محاسبه قرار گرفت.

در آزمایش دوم، در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزلآلای پاچنار لرستان، برای تخم کشی از ماهیان مولد ماده چهار ساله با میانگین ۱۵ عدد تخم در هر گرم استفاده شد و سایر مراحل همانند کارگاه کلاردشت اعمال شد با این تفاوت که در اینجا اعمال تیمارها فقط تا مرحله چشم زدگی صورت گرفت و در تیمار غلظت پراکسید هیدروژن علاوه بر غلظت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی ام ۲۵۰ پی ام نیز اضافه شد.

برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب کارگاه تکثیر که از محل چشممه تامین می شد، ذکر شده است.

$102 \text{ mg/L as CaCO}_3$ = سختی کل

$95 \text{ mg/L as CaCO}_3$ = خاصیت قلیایی

-۱ Redox Potential این شاخص محاسبه ای از مقدار نسبی بارهای مثبت و منفی یا احیا شونده در محلول است و مولکول های اکسید بر حسب میلی ولت (mv) بیان می شود.

بررسی مقایسه‌ای اثر پراکسید هیدروژن (آب اکسیرنه) و سبز مالاشیت در...

جدول ۱- تیمار با غلظت‌های مختلف و مدت زمان تماس H_2O_2 بر روی میزان رشد قارچ

غلظت (H_2O_2) (ppm)	مدت زمان تماس (دقیقه)	سپرولگنیا (spp.)
۳	۳۰	+ ^a
۳	۱۵	+
۳۰	۳۰	+
۳۰	۱۵	+
۲۵۰	۳۰	- ^b
۲۵۰	۱۵	-
—	—	کنترل

(a) میزان رشد قارچ ۴۸ ساعت بعد از اعمال تیمارها بیش از ۳۰ میلی متر اندازه گیری شد.

(b) ۴۸ ساعت بعد از اعمال تیمارها، هیچ‌گونه علامتی از رشد قارچ مشاهده نشد.

فعالیت قارچ کشی H_2O_2 : چنانچه در جدول (۲) نشان داده شده، در کارگاه کلاردشت، درصد آلودگی ($\times 100$) تعداد کل تخم‌ها/تعداد تخم‌های آلوده، تعداد توده‌های قارچی، تعداد تخم در هر توده و درصد تخم‌گشایی ثبت شد. اما میزان تخم‌گشایی کاهش می‌یابد ($p < 0.05$), اما میزان تخم‌گشایی اگر > 0.05 باشد ($p < 0.001$). تیمار با غلظت 500 mg/l از H_2O_2 به مدت ۳۰ دقیقه اگر چه سبب بهبود میزان تخم‌گشایی نسبت به سبز مالاشیت شد ($p < 0.05$), اما برای کنترل کامل رشد قارچ، کافی نبود ($p < 0.001$).

فعالیت قارچ کشی H_2O_2 : چنانچه در جدول (۲) نشان داده شده، در کارگاه کلاردشت، درصد آلودگی ($\times 100$) تعداد کل تخم‌ها/تعداد تخم‌های آلوده، تعداد توده‌های قارچی، تعداد تخم در هر توده و درصد تخم‌گشایی ثبت شد.

چنانچه مشهود است، غلظت 1000 mg/l از H_2O_2 به مدت ۳۰ دقیقه برای کنترل موثر قارچی، کافی است

جدول ۲- درصد آلودگی، تعداد توده‌های قارچی، تعداد تخم در هر توده و درصد تخم‌گشایی تخم‌های ماهی قزلآلای رنگین کمان درمان شده، با مالاشیت گرین (mg/l) و پراکسید هیدروژن (ppm) برای مدت زمان‌های مختلف در دمای $10/5^{\circ}\text{C}$ میانگین (Mean \pm SD)

نوع دارو	تیمار	مدت زمان استعمال دارو (دقیقه)	درصد آلودگی	تعداد تخم در هر توده قارچی	تعداد توده های قارچی	درصد تخم‌گشایی (Mean \pm SD)
پراکسید هیدروژن	۱۰۰۰	۳۰	۱/۵۶ \pm ۰/۳۲	۵/۶۶ \pm ۲/۰۸	۲/۳۳ \pm ۰/۰۷	۴۴/۸۸ \pm ۰/۳۰ a
		۱۵	۶/۲۰ \pm ۱/۴۴	۱۸/۰۰ \pm ۶/۰۰	۶/۶۶ \pm ۲/۰۵	۴۴/۴ \pm ۰/۰۰ b
سبز مالاشیت	۵۰۰	۳۰	۴/۳۰ \pm ۰/۴۰	۱۴/۳۳ \pm ۲/۲۱	۵/۳۳ \pm ۰/۰۷	۷۱/۱۰ \pm ۱/۲۳ a
		۱۵	۷/۱۰ \pm ۱/۴۸	۲۲/۰۰ \pm ۲/۶۴	۷/۶۶ \pm ۲/۰۱	۶۱/۵ \pm ۷/۰۵ b
۲		۶۰	۱/۰۰ \pm ۰/۴۳	۴۷/۷۸ \pm ۱/۹۵	۲/۸۵ \pm ۰/۴۶	۵۴/۱ \pm ۳/۴۵ a
—	کنترل	—	—	—	—	۹/۷۳ \pm ۲/۸۰

a: عدم مشاهده رشد قارچ بعد از ۷۲ ساعت

b: مشاهده رشد قارچ بعد از ۷۲ ساعت

پراکسید هیدروژن میانگین 250 mV ثبت گردید که بعد از اعمال تیمارها، این مقدار برای آب به $+44\text{ mV}$ رسید، این رقم، بیانگر عملکرد صحیح پراکسید هیدروژن در حذف بار

همان‌طور که قبل ذکر شد، پارامترهایی چون پتانسیل ردیکس آب و پراکسید هیدروژن اندازه گیری شد، به‌طوری‌که در خصوص آب میانگین -22 mV و برای

بر روی کاربر و محیط زیست ندارد بلکه سبب افزایش میزان اکسیژن محلول آب، در خروجی می‌گردد. تکرار آزمایش‌ها با H_2O_2 : در آزمایش دوم که در کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای پاچنار لرستان انجام شد، تیمار با غلظت 250 ppm از پراکسید هیدروژن به مدت ۳۰ دقیقه برای کنترل رشد قارچ موثر تشخیص داده شد و تیمارهای 1000 ppm و 500 ppm نیز اگرچه برای کنترل رشد قارچ موثر بودند، اما تاثیرات سمی بر روی تخم داشتند، بهطوری که به ترتیب $1/0.8 \pm 1/0.8$ و $1/0.66 \pm 1/0.6$ درصد موجب تلفات و مرگ و میر شدند (جدول ۳).

آلی موجود در محیط است. در ضمن، تغییرات قابل توجهی در مورد pH و درجه حرارت مشاهده نشد، اما میزان اکسیژن محلول آب در زمان اعمال تیمارها با پراکسید هیدروژن افزایش یافت، بدین ترتیب که میزان اکسیژن در ورودی معادل $8-9\text{ mg/l}$ و در خروجی معادل 7 mg/l برای تیمار شاهد ثبت شد، ولی با اعمال تیمار پراکسید هیدروژن با غلظت 500 ppm این مقدار در خروجی به 10 mg/l و برای تیمار با غلظت 1000 ppm میزان 14 mg/l در خروجی ثبت شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از پراکسید هیدروژن آثار مخربی

جدول ۳- میزان تلفات و مرگ و میر تخم‌های ماهی در کارگاه تکثیر پاچنار با اعمال غلظت‌های مختلف از H_2O_2 برای مدت زمان‌های مختلف در دمای 7°C
استعمال مختلف در دمای

نوع دارو	غلظت تیمارهای مختلف	مدت زمان (دقیقه)	تلفات (Mean \pm SD)
پراکسید هیدروژن ppm	۱۰۰	۳۰	$8/5 \pm 1/0.8$
	۵۰۰	۱۵	$38/62 \pm 0/88$
	۲۵۰	۳۰	$18/63 \pm 1/15$
	۲	۱۵	$4/10 \pm 0/55$
سبز ملاشیت mg/L	۶		$1/4 \pm 0/17$

تیمار 500 ppm پراکسید هیدروژن به مدت ۱۵ دقیقه، بهصورت یک روز در میان می‌تواند از آلودگی قارچی تخم‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان جلوگیری کند اما در این مطالعه، این مسئله در کارگاه کلاردشت تایید نشده ولی میزان تخم گشاپی را نسبت به سبز ملاشیت بهبود بخشید، اما در مورد کارگاه پاچنار مطلب مذکور تائید شد و در نهایت تیمار 250 mg/l از H_2O_2 به مدت ۳۰ دقیقه در این کارگاه، نه تنها برای کنترل موثر رشد قارچ کافی تشخیص داده شد، بلکه فقد تاثیرات سمی بر روی تخم‌ها بود. البته ذکر این نکته لازم است که پراکسید هیدروژن مورد استفاده در این طرح که از نوع 35 درصد

بحث و نتیجه‌گیری

پراکسید هیدروژن، ماده نسبتاً مطمئنی است در صنایع غذایی و بهداشت آب آشامیدنی که به عنوان عامل ضدمیکروبی کاربرد دارد، همچنین در صنایع نساجی به عنوان عامل رنگبری به کار می‌رود، و بر روی دامنه وسیعی از میکرووارگانیسم‌ها از قبیل باکتری‌ها، مخمرها و اسپورهای قارچی موثر بوده و دارای خاصیت ضدغوفونی‌کنندگی مورثی است (۲).

پژوهش انجام شده، نتایج تحقیقات (۴، ۷ و ۸) را در مورد تاثیرات قارچ کشی تیمار 1000 ppm از پراکسید هیدروژن تایید می‌کند، ولی در این بررسی، کاهش درصد تخم‌گشاپی در مورد این تیمار مشاهده شد چرا که این غلظت دارای تاثیرات سمی بر روی تخم ماهی بود. اگرچه

مشاهده شد. بدین ترتیب که در کارگاه کلاردشت که سختی کل معادل 133 mg/l بود، غلظت 500 ppm برخلاف غلظت 1000 ppm فاقد تاثیرات سمی بر روی تخم بود، درحالی که در کارگاه پاچنار، که سختی کل معادل 103 mg/l بود، هر دو غلظت 1000 ppm و 500 ppm تاثیر سمی بر روی تخم داشتند. البته خود این پدیده می‌تواند موضوع تحقیقات جدیدی در این زمینه باشد.

تقدیر و تشکر

در پایان، از آقایان دکتر رفیعی، مهندس ولکی و حاج محمدرضا حاجیوند که هماهنگی‌های لازم را برای اجرای این طرح پژوهشی به ترتیب در کارگاه‌های تکثیر و پرورش کلاردشت و پاچنار عهده دار بودند، سپاسگزاریم. از آقای مایک بارنز از کارگاه تکثیر ایالتی مک ننی ایالات متحده، همچنین از کارکنان کارگاه تکثیر و پرورش آزادمایان کلاردشت و سرکار خانم رمضانی که در هموار ساختن مسیر انجام طرح پژوهشی سهمی بهسازی داشتند، سپاسگزاری می‌شود.

صنعتی بود، به عنوان ماده فعال 1-درصد در نظر گرفته شد.

غلظت پراکسید هیدروژن که برای کنترل رشد قارچ بر روی تخمهای ماهی قزل‌آلای زنگین کمان، در یک کارگاه، موثر تشخیص داده می‌شود، ممکن است بسته به نوع منبع آبی (که در مورد طرح پژوهشی مذبور در دو مورد متفاوت بود)، خصوصیات شیمیابی آب و تراکم اسپورهای قارچی در کارگاه دیگر متفاوت باشد، بهطوری‌که تیمار 250 ppm ممکن است در کارگاه تکثیر ماهی صحیح عمل کند، اما در کارگاه دیگری نیاز به تیمار با غلظت‌های بالاتر تا حد 1000 ppm برای کنترل کامل رشد قارچ باشد، این پدیده را می‌توان به احتمال زیاد مربوط به شاخص سختی کل آب مربوط دانست، چرا که در مورد یکسری داروهای شیمیابی دیگر از قبیل سولفات مس هم غلظت داروی مورد استفاده با شاخص سختی کل ارتباط تنگاتنگ دارد، بهطوری‌که با کاهش سختی در صورت استفاده از غلظت‌های زیاد این دارو، عوارض سمیت آن در محیط بروز می‌کند و با افزایش سختی کل، اثر دارو در محیط خنثی می‌شود که این پدیده در مورد پر اکسید هیدروژن هم

منابع

- ۱- ابراهیم زاده، موسوی، حسینعلی ۱۳۷۷. بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفید، رساله دکتری تخصصی دامپزشکی در رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
- ۲- ایماندل، کرامت ا... ۱۳۷۵. گندزدایها و ضدغونی کننده‌ها و کاربرد آن در بهداشت محیط زیست.
- ۳- سادات اخوی، سید رضا، ۱۳۷۲-۷۳. بررسی آلوڈگی‌های قارچی در کارگاه تکثیر و پرورش شهید بهشتی (سد سنگر) رساله دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
- 4-Barnes, M.E., D.E. Wwing, T.T. Cordes, and G.L yong. 1998. Observation on Hydrogen Peroxide Control of Saprolegnia spp, During Rainbow Trout Egg Incubation. The Progressive Fish-Culturist, Vol 59 (No.4). P. 67-70.
- 5-Foster, F.J., and K.A. Oster. 1947. The Use of Malachite Green as a Fish Fungicidol and Antiseptic, The Progressive Fish Culturist, 3 (18): 7-9
- 6-Kitancharoen, N., A. Yamaoto., and K.Hatai, 1997. Fungicidal Effect of Hydrogen Peroxide on Fungal Infection of Rainbow Trout Eggs. Mycoscience, 38:375-378.
- 7-Kitancharoen, N., A. Yamato., and K.Hatai, 1998. Effects of Sodium Chloride Hydrogen Peroxide and Malachite Green on Fungal Infection in Rain How Trout Eggs, Biocontrol Science, Vol 3, No.2, 113-115.
- 8-Marking, L.L., J.J. Rach, and J.M. Schreier. 1994. Evaluation of Antifungal Agents for Fish Cultur, The Progressive Fish Culturist, Vol 56 (No.4) P:225.231.
- 9- Srivastava, R.C. 1986. Fish Mycopathology, P:11-45.

A Comparative Study of the Effect of Hydrogen Peroxide as against Mallachite Green Used for Prevention and Control of Fungal Infection During Hatching Peroid in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*) Eggs

A.R. Mirvaghefi¹

G. Azari Takami²

S.A. Jafarpour³

Abstract

An experiment was conducted to investigate the effects of different doses of hydrogen peroxide on fertilized eggs of rainbow trout as compared to use of mallachite green, which is commonly used in hatcheries. For *In vitro* tests, treatment with 250, 500 or 1000 mg/l of H_2O_2 for either 15 or 30 min was shown to be effective in control of fungi (controlled fungi in petridish), and for *In vivo* test, treatment with 250 mg/l of H_2O_2 for 30 min at 7°C was adequate for complete fungal control. There were no significant differences doserved with 2 mg/l malachite green in terms of either percentage of eggs infected or mortality until eyed egg stage. The results indicate that H_2O_2 is not only not dengerous for hygienic and environmental conditions but prolitable and suitable due to oxygen release and improvement of water quality.

Keywords: Hydrogeen peroxide, Malachite green, Fungal infection, Mortality rate, Rainbow trout.

¹ - Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran (E-mail: vaghefi@nrf.ut.ac.ir)

² - Professor, Faculty of Veterinary, University of Tehran

³ -Former Graduate Student, Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran